

I. Implication


$$A \Rightarrow B = \bar{A} \cup B$$

II. Ensembles

1. Partie d'un ensemble

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

2. Opérations sur les ensembles



3. Applications

Application	Injective	Surjective
Une application de E dans F associe à tout élément de E un unique élément de F	f est injective si : $\forall (x, y) \in E^2, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ $\forall (x, y) \in E^2, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$	f surjective si : $\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$

4. Cardinal d'un ensemble

Card E = nombre d'éléments de E

- Il existe f **injective** de E dans F $\Leftrightarrow \text{Card } E \leq \text{Card } F$
- Il existe f **surjective** de E dans F $\Leftrightarrow \text{Card } E \geq \text{Card } F$
- Il existe f **bijjective** de E dans F $\Leftrightarrow \text{Card } E = \text{Card } F$

5. Relation d'équivalence

Définition	Propriétés possibles	Classes et ensemble q.
R : $E^2 \rightarrow \{V, F\}$ $(x, y) \rightarrow xRy$	<ul style="list-style-type: none"> Réflexive : xRx Symétrique : $xRy \Rightarrow yRx$ Transitive : xRy et $yRz \Rightarrow xRz$ 	$\bar{x} = \{x' \in E \mid xRx'\}$ Éléments en relation avec x $E/R = \{\bar{x} \mid x \in E\}$

R est une relation. Si elle respecte les 3 propriétés, c'est une relation d'équivalence.

III. Structures algébriques

1. Loïs de composition interne

Définition	Propriétés possibles
$*$: $E^2 \rightarrow E$ $(x, y) \rightarrow x * y$	<ul style="list-style-type: none"> Associative : $(x * y) * z = x * (y * z) = x * y * z$ Commutative : $x * y = y * x$ Possède e neutre : $e * x = x * e = x$ Tout x a un symétrique x' : $x * x' = e$

2. Groupe

Définition
$(E, *)$ est un groupe si $*$ est associative , $*$ possède un neutre et tout élément de E a un symétrique par $*$.

3. Sous-groupe

Définition	Théorème
Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$, Si $(H, *)$ est un groupe, Alors $(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$	Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$, Si $\forall (h, h') \in H^2, h * h'^{-1} \in H$ Alors $(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$

4. Groupe engendré par une partie A

Définition
Soit $(G, *)$ un groupe et $A \subset G$, Alors $gr(A)$ = groupe engendré par A = plus petit sous-groupe de G contenant A

5. Anneau et corps

Anneau	Corps
Soit $(A, +)$ un groupe commutatif, Soit $\cdot$ une l.c.i. associative sur A, Si $\cdot$ possède un neutre 1_A , Et $\cdot$ distributive par rapport à +, Alors $(A, +, \cdot)$ est un anneau	Si $(A, +, \cdot)$ est un anneau, Et $(A \setminus \{0_A\}, \cdot)$ est un groupe, Alors $(A, +, \cdot)$ est un corps

6. Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

- $n\mathbb{Z} = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$ = multiples de n
- Soient H et H' des sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$, $H + H' = \{h + h' \mid (h, h') \in H \times H'\}$
- $gr(\{n\}) = n\mathbb{Z}$
- $gr(\{a, b\}) = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$
- H sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, $\exists ! n \in \mathbb{N}, H = gr(\{n\}) = n\mathbb{Z}$
- $n\mathbb{Z} = n'\mathbb{Z} \Leftrightarrow n = n'$
- Soit $n = a \wedge b$, $(a + b)\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$

Théorème de Bezout :

$$(a, b) \in \mathbb{Z}^2, \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = a \wedge b$$

$$a \wedge b = 1 \Leftrightarrow \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = 1$$