

I. Nature et description des variables

- **Quantitative** : Modalités comparables entre elles
 - **Discrète / continue** : modalités dénombrable / indénombrables
- **Qualitative**
 - **Binaire / Multimodale** : deux modalités / plus de 2.
 - **Ordinale (ou non)** : existence d'un ordre

Définition			Formule		Q	Q	Q	Q	Q		
• Fonction de répartition empirique $\widehat{F}_X$ (cas continu)			$\widehat{F}_X(x) = \widehat{F}_l^c + (\widehat{F}_l^c - \widehat{F}_{l-1}^c) \frac{x - x_{l-1}}{x_l - x_{l-1}}$ <div>$\widehat{F}_X(x_i) = \widehat{F}_l^c = \widehat{F}_l - \frac{1}{2}(\widehat{F}_l - \widehat{F}_{l-1})$</div>						X		
• Moyenne $\bar{x}$	$\min_{\bar{x} \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$	Moyenne empirique : <div>$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n \widehat{f}_i x_i$</div>		Espérance : $\mathbb{E}(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}$		x	x	X	X		
• Médiane M	$\min_{M \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n x_i - M $	$\widehat{F}_X(M) = \frac{1}{2}$		$\mathbb{P}(X \leq M) = \frac{1}{2}$	x			X	X		
• Variance S	$\widehat{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$		$\widehat{S} = \sqrt{\widehat{S}^2}$ Ecart type	$S^2 = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}^2(X))$		x	x	X	X		
• Fractile et quartile	$\widehat{F}_X(\widehat{\phi}_p) = p$	$\widehat{Q}_1 = \widehat{\phi}_{\frac{1}{4}}$	$\widehat{Q}_3 = \widehat{\phi}_{\frac{3}{4}}$	$DIQ = \widehat{Q}_3 - \widehat{Q}_1$	$MAD = mediane(x_i - \widehat{M})$			X	X		
• Moment et moment centré	$\widehat{m}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$	$\widehat{m}\widehat{c}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$		$\bar{x} = \widehat{m}_1$ Moyenne	$\widehat{S}^2 = \widehat{m}\widehat{c}_2$ Variance	$\frac{\widehat{m}\widehat{c}_3}{\widehat{S}^3}$ Dissymétrie	$\frac{\widehat{m}\widehat{c}_4}{\widehat{S}^4}$ Aplatissement	x	x	X	X
• Dép. : (X, Y quant.)	$s_{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ $= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i y_i - \bar{x}\bar{y})$ Covariance		$s_X^2 = s_{XX} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ $s_Y^2 = s_{YY} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ Variance		<div>$r = \frac{s_{XY}}{s_X s_Y}$</div> Corrélation $\in [-1;1]$ $r \approx 0 \Rightarrow x \text{ indep } y$ $r \approx 1 \Rightarrow x \nearrow y \nearrow$ $r \approx -1 \Rightarrow x \nearrow y \searrow$						
• Dép. : (X qual, Y quant) Coef. de détermination	$S_{Y/X}^2 = \frac{\sum_{j \in \Omega_X} n_j (\bar{y}_j - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$										

II. L'ACP

Problème : $\min_{u,v} J(u,v) = \min_{u,v} \|X - uv^T\|_F^2 = \min_{u,v} -2(Xv)^T u + \|u\|^2 + \|v\|^2 = \min_{u,v} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p (x_{ij} - u_i v_j)^2$

Solution : $\begin{cases} \nabla_u J(u) = -2Xv + 2\|v\|^2 u = 0 \\ \nabla_v J(v) = -2X^T u + 2\|u\|^2 v = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Xv = \|v\|^2 u \\ -X^T u = \|u\|^2 v \end{cases} \Leftrightarrow X^T X v = \underbrace{\frac{\|u\|^2}{\lambda} \|v\|^2}_{\lambda} v$

$$\Sigma = \frac{X_C^T X_C}{n}$$

Matrice de covariance

$$\rho = \frac{X_R^T X_R}{n}$$

Matrice de corrélation

$$[v, \lambda] = eig(X)$$


ACP

$$u = Xv$$

Données dans l'ACP

$$v_n = \sqrt{\frac{\lambda}{n}} v$$

Rôle des variables



Nombre d'intervalles d'un histogramme : $p \geq 1 + \log n$
règle de Sturges

$$p = \frac{3,5\delta}{\sqrt[3]{n}}$$

règle de Scott

$$p = \frac{2 DIQ}{\sqrt[3]{n}}$$

règle de Freedman Diaconis

III. La régression linéaire

1. Le modèle

$$\boxed{y = X\alpha + \varepsilon} \quad x_i = \begin{pmatrix} x_{1i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad e = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad \varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \dots & x_{np} \end{pmatrix} \quad \alpha = \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix}$$

2. Solution

$$\boxed{\hat{a} = \frac{\text{cov}(x, y)}{V_x}} \quad \boxed{\hat{b} = \bar{x}\hat{a} + \bar{y}} \quad X^T \varepsilon = 0 \Rightarrow X^T(y - X\hat{a}) = 0 \Rightarrow (X^T X)\hat{a} = X^T y \Leftrightarrow \boxed{\hat{a} = (X^T X)^{-1} X^T y}$$


Régression simple

3. Prévision


$$z = X\alpha = \underbrace{X(X^T X)^{-1} X^T}_H y = Hy$$

4. Diagnostic


Résultat	Formule		
R ²	<div>$\underbrace{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}_{SC \text{ Total}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2}_{SC \text{ Résiduels}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{y})^2}_{SC \text{ Expliqué}}$$R = cor(\mathbf{y}, \mathbf{z})$coefficient de corrélation multiple</div> <div>$R^2 = \frac{SC \text{ Expliqué}}{SC \text{ Total}}$$0 \leq R^2 \leq 1$$R = 1 : \text{modèle bon}$$R = 0 : \text{modèle mauvais}$$R^2 = r_{XY}^2$en régression simple</div>		
Matrice d'influence	$z = \underbrace{X(X^T X)^{-1} X^T}_H y = Hy \quad z_i = H_{i\bullet}^T y \quad H_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}$ <p>Pour la régression simple</p>		
Variances estimées	$s^2 = \frac{1}{n - p} \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i$	$(s^{(-i)})^2 = \frac{1}{n - p - 1} \left(\sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2 - \frac{\hat{\varepsilon}_i^2}{1 - H_{ii}} \right)$	
Résidus	$\hat{\varepsilon} = y - z$ $\hat{\varepsilon} = (I - H)y$ <p>Résidus</p> <p>Sans structure / distrib. normal / pas d'aberrants</p>	$r_i = \frac{\hat{\varepsilon}_i}{s\sqrt{1 - H_{ii}}} = \frac{\hat{\varepsilon}_i}{\sqrt{V(\hat{\varepsilon}_i)}}$ <p>Résidus standardisés</p>	
Divergence	$\hat{\varepsilon}_i^{(-i)} = \frac{\hat{\varepsilon}_i}{1 - H_{ii}} = y_i - z_i^{-i}$ <p>Résidus de validation croisée</p>	$err_{VC} = \sum_{i=1}^n (\hat{\varepsilon}_i^{(-i)})^2$ <p>Erreur de validation croisée</p>	$t_i = \frac{\hat{\varepsilon}_i}{s^{(-i)}\sqrt{1 - H_{ii}}} = \frac{\hat{\varepsilon}_i^{(-i)}}{\sqrt{V(\hat{\varepsilon}_i^{(-i)})}}$ <p>Résidus studentisés = résidus de VC normalisés</p>
Levier et contribution	$\boxed{levier_i = H_{ii}} = \ H_{i\bullet}\ ^2$ <p>Important si $H_{ii} > \frac{2(p+1)}{n}$</p> <p>Levier</p>	$c_i = \frac{H_{ii}}{p(1 - H_{ii})} \frac{\hat{\varepsilon}_i^2}{s^2}$ <p>Suspect si $c_i > \frac{4}{n}$</p> <p>Contribution</p>	
Cp de Mallows	$Cp = \frac{1}{s^2} \sum_{i=1}^n (y_i - z_i^{(-i)})^2 - n + 2p$ <p>Conserver la combinaison de variable avec le plus faible Cp</p>		



Médiane de Tukey



Médiane de Jarvis



Sac médian

	2 qualitatives : test du χ^2	1 qualitative, 1 quantitative : test de Student	2 quantitatives : test de Student																																															
Données	<table><tr><th>X \ Y</th><th>b_1</th><th>...</th><th>b_J</th><th>marge</th></tr><tr><th>a_1</th><td>n_{11}</td><td>...</td><td>n_{1J}</td><td>$n_{1\bullet}$</td></tr><tr><th>$\vdots$</th><td>$\vdots$</td><td>$\ddots$</td><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td></tr><tr><th>a_I</th><td>n_{I1}</td><td>...</td><td>n_{IJ}</td><td>$n_{I\bullet}$</td></tr><tr><th>marge</th><td>$n_{\bullet 1}$</td><td>...</td><td>$n_{\bullet J}$</td><td>$n_{\bullet\bullet} = n$</td></tr></table>	X \ Y	b_1	...	b_J	marge	a_1	n_{11}	...	n_{1J}	$n_{1\bullet}$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	a_I	n_{I1}	...	n_{IJ}	$n_{I\bullet}$	marge	$n_{\bullet 1}$	...	$n_{\bullet J}$	$n_{\bullet\bullet} = n$	<table><tr><th>Y</th><th>X</th></tr><tr><td>a</td><td>x_{a_1}</td></tr><tr><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td></tr><tr><td>a</td><td>$x_{a_{n_a}}$</td></tr><tr><td>b</td><td>$= x_{b_1}$</td></tr><tr><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td></tr><tr><td>b</td><td>$x_{b_{n_b}}$</td></tr></table>	Y	X	a	x_{a_1}	$\vdots$	$\vdots$	a	$x_{a_{n_a}}$	b	$= x_{b_1}$	$\vdots$	$\vdots$	b	$x_{b_{n_b}}$	<table><tr><th>Y</th><th>X</th></tr><tr><td>y_1</td><td>x_1</td></tr><tr><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td></tr><tr><td>y_n</td><td>x_n</td></tr></table> $y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$	Y	X	y_1	x_1	$\vdots$	$\vdots$	y_n	x_n
X \ Y	b_1	...	b_J	marge																																														
a_1	n_{11}	...	n_{1J}	$n_{1\bullet}$																																														
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$																																														
a_I	n_{I1}	...	n_{IJ}	$n_{I\bullet}$																																														
marge	$n_{\bullet 1}$	...	$n_{\bullet J}$	$n_{\bullet\bullet} = n$																																														
Y	X																																																	
a	x_{a_1}																																																	
$\vdots$	$\vdots$																																																	
a	$x_{a_{n_a}}$																																																	
b	$= x_{b_1}$																																																	
$\vdots$	$\vdots$																																																	
b	$x_{b_{n_b}}$																																																	
Y	X																																																	
y_1	x_1																																																	
$\vdots$	$\vdots$																																																	
y_n	x_n																																																	
Hypothèses	$\begin{cases} \mathcal{H}_0 : \text{référence} & \Leftrightarrow \text{indépendance} \\ \mathcal{H}_1 : \text{alternative} & \Leftrightarrow \text{dépendance} \end{cases}$	$\begin{cases} \mathcal{H}_0 : \mu_a = \mu_b & X \text{ et } Y \text{ indépendants} \\ \mathcal{H}_{1_1} : \mu_a < \mu_b \\ \mathcal{H}_{1_2} : \mu_a > \mu_b & X \text{ et } Y \text{ dépendants} \\ \mathcal{H}_{1_3} : \mu_a \neq \mu_b \end{cases}$	$\begin{cases} \mathcal{H}_0 : \text{indépendance} & \Leftrightarrow a = 0 \\ \mathcal{H}_1 : \text{dépendance} & \Leftrightarrow a \neq 0 \end{cases}$																																															
Modèle	$\mathbb{P}\left((X = x_i) \cap (Y = y_j)\right)$ $= \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$	$\overline{X}_a \sim \mathcal{N}\left(\mu_a, \frac{\sigma^2}{n_a}\right) \quad \overline{X}_b \sim \mathcal{N}\left(\mu_b, \frac{\sigma^2}{n_b}\right) \quad \sigma = \sigma_a = \sigma_b$ même variance	$\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \Rightarrow \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2 \sim \chi_{n-2}^2$																																															
Statistique	<div>$D_{\chi^2} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{\left(n_{ij} - \frac{n_{i\bullet} n_{\bullet j}}{n}\right)^2}{\frac{n_{i\bullet} n_{\bullet j}}{n}} \sim \chi_{(I-1)(J-1)}^2$<p style="text-align: center;">eff obs eff th</p>$D_{\chi^2} = n \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(\widehat{\mathbb{P}}_{ij} - \widehat{\mathbb{P}}_i \widehat{\mathbb{P}}_j)^2}{\widehat{\mathbb{P}}_i \widehat{\mathbb{P}}_j}$</div>	<div>$U = \frac{\overline{X}_a - \overline{X}_b}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_a} + \frac{1}{n_b}\right)}} \sim \mathcal{N}(0,1)$<p style="text-align: center;">Variance connue σ^2</p></div> <div>$T = \frac{\overline{X}_a - \overline{X}_b}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n_a} + \frac{1}{n_b}\right)}} \sim \mathcal{T}_{n_a+n_b-2}$<p style="text-align: center;">Variance inconnue estimée $\hat{\sigma}^2$</p>$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_a} (x_{a_i} - \overline{x}_a)^2 + \sum_{i=1}^{n_b} (x_{b_i} - \overline{x}_b)^2}{n_a + n_b - 2}$</div>	<div>$U = \frac{\hat{a} - a}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{S_X^2}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$<p style="text-align: center;">Variance connue σ^2</p></div> <div>$T = \frac{\hat{a} - a}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_X^2}}} \sim \mathcal{T}_{n-2}$<p style="text-align: center;">Variance estimée $\hat{\sigma}^2$</p>$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2}{n-2} = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - (\hat{a}x_i + \hat{b}))^2}{n-2}$</div>																																															
Valeur	Calcul de $D_{\chi^2_{obs}}$, u , ou t ; valeur de D_{χ^2} , U , ou T à partir des données.																																																	
p-valeur	$p\text{-val} = \mathbb{P}\left(D_{\chi_n^2} \geq D_{\chi^2_{obs}}\right)$	$p\text{-val} = \begin{cases} \mathbb{P}(U \leq u) & \text{si } \mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_{1_1} \\ \mathbb{P}(U \geq u) & \text{si } \mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_{1_2} \\ \mathbb{P}(U \leq - u) + \mathbb{P}(U \geq u) & \text{si } \mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_{1_3} \end{cases}$	$p\text{-val} = \mathbb{P}(U \geq u) = \mathbb{P}(U \leq - u) + \mathbb{P}(U \geq u)$																																															
Décision	p-valeur : probabilité d'obtenir un tableau encore plus « rare » au hasard. Se lit généralement dans la table de la loi utilisée. <ul style="list-style-type: none">$p\text{-val} < 5\%$: on garde $\mathcal{H}_1$ (« peu de tableaux sont plus rares, ce n'est pas du hasard »)$p\text{-val} \geq 5\%$: on garde $\mathcal{H}_0$ (« le tableau n'est pas si rare, ça peut être le hasard »)																																																	

Loi du χ^2	Thm de Pearson	Loi de Student
$Z_n = \sum_{i=1}^n Y_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$ $Z_n \sim \chi_n^2$ $Y_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $\mathbb{E}(Z_n) = n \quad V(Z_n) = 2n \quad \frac{Z_n - n}{\sqrt{2n}} \rightarrow \mathcal{N}(0,1)$	$X_i = \frac{N_i - n\hat{p}_i}{\sqrt{n\hat{p}_i}}$ $\sum_{i=1}^I X_i^2 \rightarrow \chi_{I-1}^2$ $X_{ij} = \frac{N_{ij} - n\hat{p}_{ij}}{\sqrt{n\hat{p}_{ij}}}$ $\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J X_{ij}^2 \rightarrow \chi_{(I-1)(J-1)}^2$	$T_n = \frac{N}{\sqrt{\frac{X_n}{n}}}$ $T_n \sim \mathcal{T}_n$ $N \sim \mathcal{N}(0,1)$ $X_n \sim \chi_n^2$ $T_n \rightarrow \mathcal{N}(0,1)$

%%% Manipulation d'objets %%%

```
vl = linspace(a, b, n) % génère n points entre a et b
ma = ones(n,p) % matrice n x p de 1
n = length(x) % plus grande dimension de x
[n p] = size(x) % hauteur et largeur de x

vc = x(:, p) % pième colonne de la matrice
vl = x(n, :) % nième ligne de la matrice
ma = x(3:4, 2:5) % sous-matrice (2 x 3)
vc = x(1:2:end, 1); % matrice contenant un élément sur 2 de la 1ère
colonne de x

vc = diag(x) % matrice des éléments sur la diagonale de x
vc = find(x > a & x <= b) % indices des éléments de x correspondants
```

%%% calculs courants %%%

```
n = mean(x) % moyenne de x
n = median(x) % mediana de x
n = mode(x) % mode de x
n = var(x,1) % variance de x
n = std(x,1) % écart type de x
n = min(x) % minimum de x
n = max(x) % maximum de x
vc = sum(x) % somme de x
vc = cumsum(x) % somme cumulée de x
```

```
f = x/sum(x)
F = cumsum(f)
Fc = F - 1/2*( F - [0 F(1:n -1)]); % fct. de répartition empirique (cas
continu)
```

%%% matrice centrée réduite

```
xcr = (x-ones(n,1)*mean(x))./(ones(n,1)*std(x,1))
```

%%% discretiser x en nbin intervalles

```
d=linspace(min(x),max(x),nbin+1);
for i=1:nbin
    H(i)=length(find(x>d(i)&x<=d(i+1)));
end
```

%%% nombre d'observations a partir d'un échantillon

```
n = length(a);
va=[]; % valeurs
na=[]; % nb occurrences
for i=min(x):max(x)
    p=length(find(x==i));
    if p > 0
        va=[va i];
        na=[na p];
    end
end
```

%%% Affichage %%%

```
plot(x, y, 'o') % affichage d'une courbe (x, y, paramètres)
bar(x, y) % histogramme discret (x valeurs, y effectifs)
hist(x, n) % histogramme continu de x en n espaces
boxplot(x) % boîte a moustache de x
ster(x) % variation des résidus x

hold on/off % continuer à dessiner par-dessus la figure
figure(n) % affichage dans la figure n (évite de réécrire dessus)
subplot(n, p, num) % met le prochain affichage dans la case num du
subplot nxp
x/ylabel(text); % titre des axes x et y
axis([minx maxx miny maxy]); % change les axes
title(text); % titre de la figure
```

%%% ACP %%%

```
Xr = (X - e*mean(X)) % matrice centrée
Xn = Xr./(e*std(X,1)) % matrice centrée réduite
cov = 1/n*(Xr)'*(Xr) % matrice de covariance
cor = 1/n*(Xn)'*(Xn) % matrice de corrélation
[v,d] = eig(Xn'*Xn) % l'ACP
u = Xn*v % projections sur les axes de l'ACP
Vn = v*((d/n).^(1/2)) % role des variables
```

%%% Régression linéaire %%%

```
e = ones(n,1) % vecteur unitaire
a = (X'*X)\(X'*y) % coefs de la régression
z = X*a % prévision
r = y-z % résidus
SCM = sum((z-mean(y)).^2)
SCT = sum((y-mean(y)).^2)
R2 = SCM/SCT % R²
H = X*(X'*X)^(-1)*X' % matrice des contributions
h = diag(H) % contributions des observations
s2_r = (1/(n-p))*r'*r % variance estimée
r_s = r./((s2_r*(e-h)).^(1/2)) % résidus standardisés
c = h./(p*(e-h).^2).*r.^2/s2_r % contributions
err_VC = sum((r.^2)./((e-h).^2)) % erreur de validation croisée
```

%%% Tests %%%

```
pval = cdf('norm', u, m, s2) % loi normale : P(N(m, s2) < u)
pval = cdf('chi2',t,n)) % loi du chi2 : P(D_n < t)
pval = cdf('T',t,n)) % loi de student : P(T_n < t)
```